

## **Relácia o vykonaní orálnej vakcinácie lišok proti besnote**

Vážení občania!

Besnotu voľne žijúcich zvierat je možné tlmit' orálnou vakcináciou lišok. Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky organizuje päťdesiatu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich lišok proti besnote. Cieľom programu je včas detegovať výskyt besnoty a zamedziť vzniku nových prípadov besnoty v Slovenskej republike.

**„Jesenná kampaň 2024“** orálnej vakcinácie lišok proti besnote bude spolufinancovaná Európskou úniou na základe Rozhodnutia o finančnom príspevku schvaľujúcej národné programy a pridružené financovanie, do výšky 30 % nákladov na laboratórne testy, nákup a distribúciu očkovacej látky a jednorazovú platbu za voľne žijúce zvierat, z ktorého sa odobrala vzorka.

**Termin orálnej vakcinácie – pokladanie vakcinačných návnad sa vykoná letecky, v dňoch 7. októbra až 27. októbra 2024.** Posun termínu je možný podľa vývoja počasia.

Vakcinačné návnady, ktoré budú pokladané lietadlami, sú čiernochneď farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie.

Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka obsahujúca vakcinačnú látku.

Obsah tobolky je načervenalej farby a tobolka je označená viacjazyčnou potlačou „**Pozor – vakcína proti besnote**“.

Rozloženie návnad lietadlami bude vykonávané z výšky 150 metrov nad terénom pri rýchlosťi 150 km/hod. v dvoch letových liniach navzájom vzdialených 500 metrov tak, aby na kilometre štvorcový bolo umiestnených 26 vakcinačných dávok. Pri leteckom pokladaní budú vynechané územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásmá ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzani neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne detí, aby sa vakcinačných návnad **nedotýkali**, nezbierali ich, a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov.

Pri náleze vakcinačnej návnady **nemanipulujte s ňou** a **urýchle opustite miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy**, ktorá by mohla lišku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

V prípade kontaktu vakcinačnej návnady so sliznicou úst, nosa alebo očí je potrebné ihneď vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť vodou a mydлом.